

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

カタセ錠[®]A

—カルシウム剤— (フィルムコーティング錠)

第3類医薬品

カタセ錠Aは、身体にとって大切な栄養成分でありながら、毎日の食事では不足しがちなカルシウムを効率よく補給するためにつくられた医薬品のカルシウム剤です。

15錠(15才以上の1日量)で602mgのカルシウムを含有しています。

1. 骨がもろくなるのを防ぎ、骨や歯の発育を促します。
2. 吸収のよい2種類のカルシウム成分を配合し、不足しがちなカルシウムを効率よく補給します。
3. カルシウムの吸収を助けるアミノ酸(L-リシン塩酸塩、タウリン)と胆汁酸成分ウルソデオキシコール酸を配合しています。

【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘
3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

- 次の場合の骨歯の発育促進：
虚弱体質、腺病質^{*}。
- 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止^{せいいじやく}。

〔※腺病質：^{しんしゅつせい}滲出性あるいはリンパ体質(アレルギー、湿疹などになりやすい体質)の小児や無力体質(体力のない体質)、神経質のことをいいます。〕

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15才以上	5 錠	3 回
11才以上 15才未満	3 錠	
7才以上 11才未満	2 錠	
5才以上 7才未満	1 錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成分】 (15錠中)

成分	分量	解説
沈降炭酸カルシウム	1,225 mg	カルシウムとして490mg。 カルシウムは丈夫な骨や歯をつくるために必要なミネラルです。
グルコン酸 カルシウム水和物	1,250 mg	カルシウムとして112mg。 カルシウムは丈夫な骨や歯をつくるために必要なミネラルです。
ウルソデオキシコール酸	10 mg	腸管からのカルシウム吸収促進作用があります。
L-リシン塩酸塩	100 mg	必須アミノ酸の一つ。欠乏症状として歯牙発育不全が知られています。
タウリン	167 mg	多くの動物体内に存在する含硫アミノ酸の一種です。

添加物としてD-マンニトール、カルメロース、硬化油、酸化チタン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、錠剤の破損防止のために入れています。開封後は詰め物をすててください。(開封後に詰め物を出し入れすると、湿気やホコリなどが入り込み、品質が低下する原因になる。)
- (6)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>