

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるように保管してください。

# カルシウム剤 ワダカルシューム錠<sup>®</sup>

第3類医薬品

## 特 徴

- ワダカルシューム錠は、骨がもろくなるのを防ぎ、骨や歯の発育を促すカルシウム剤です。
- 15錠(成人1日量)でカルシウムが645mgとれます。
- 小さな錠剤ですので、お子様からお年寄りの方まで服用出来ます。
- カルシウムが必要な妊娠・授乳期のお母さんや加齢にともなうカルシウムの吸収が衰えがちな方、また、骨の形成に大切な時期で、多くのカルシウムが必要な発育期の方などにも適しています。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
便秘
3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効 能・効 果

次の場合のカルシウムの補給：妊娠・授乳期、発育期、老年期

## 用 法・用 量

次の量を毎食後に服用してください。

| 年齢         | 1回量     | 1日服用回数 |
|------------|---------|--------|
| 成人(15歳以上)  | 5錠      | 3回     |
| 8歳以上 15歳未満 | 3錠      | 3回     |
| 5歳以上 8歳未満  | 2錠      | 3回     |
| 5歳未満       | 服用しないこと |        |

\*[用法・用量に関する注意]

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

### 15錠(成人1日服用量)中

リン酸水素カルシウム水和物……2550mg

乳酸カルシウム水和物…………… 150mg

クエン酸カルシウム…………… 150mg

(カルシウムとして645mg)

添加物として結晶セルロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物及びステアリン酸マグネシウムを含有する。

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化するおそれがあります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ピンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから開栓後は捨ててください。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ワダカルシウム製薬株式会社 お客様相談窓口

〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-1-17

電話：06-6766-4810 (土・日・祝日を除く)

受付時間：10時～12時／13時～17時



ワダカルシウム製薬株式会社

〒534-0024

大阪市都島区東野田町 4-1-17