

毎日のつらい痛み

サロンパス[®] EX インドメタシン 3.5%

〈微香性〉鎮痛消炎プラスター

商品の特長

- インドメタシン3.5%配合の優れた鎮痛消炎効果。
- しなやか素材採用でやさしい貼り心地でかぶれ難い。
- 肩こりの関係部位(肩、首の付け根、肩甲骨周辺)などに貼りやすいコンパクトサイズ。
- 微香性なので使っていることが気にならない。

⚠️ [使用上の注意]**❌ してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 11歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ**【用法・用量】** 表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
インドメタシン	3.5g
l-メントール	3.5g

添加物として、エデト酸Na、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきちんと閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

《包装》5.4cm × 8.56cm …………… 20枚入、40枚入、60枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00—17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

毎日のつらい痛み
第2類医薬品
サロンパス®EX インドメタシン 3.5%配合 20枚入

サロンパスの
密着浸透力®

Hisamitsu®

20枚入

毎日のつらい痛み

サロンパス®
EX

第2類医薬品

インドメタシン
3.5%

痛みに浸透

貼りやすい
コンパクトサイズ
(サイズ:5.4cm×8.56cm)

微香性

セルフメディケーション

税 控除 対象

〈微香性〉鎮痛消炎プラスター

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み・腰痛・関節痛・筋肉痛・腱鞘炎(手・手首の痛み)
肘の痛み(テニス肘など)・打撲・ねんざ

製造番号

使用期限

第2類医薬品

サロンパス®EX
インドメタシン3.5%配合

第2類医薬品

販売名: サロンパスEX

ここを
押し開けて
ください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお
読みください。また、必要に応じてすぐ
読めるように大切に保管してください。

特
長

- インドメタシン3.5%配合の優れた鎮痛消炎効果。
- しなやか素材採用でやさしい貼り心地でかぶれ難い。
- 肩こりの関係部位(肩、首の付け根、肩甲骨周辺)などに貼りやすいコンパクトサイズ。
- 微香性なので使っていることが気にならない。

サロンパスの「密着浸透力」とは、

サロンパスを肩こりや腰痛などの時に皮膚にぴったりと貼り患部をおおうことで、有効成分が皮膚から深く浸透し痛みをジカにとります。それがサロンパスの「密着浸透力」です。



△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 11歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、
腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、
打撲、ねんざ

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回
を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

成分・分量 (膏体100g中)

インドメタシン…3.5g 0-メントール…3.5g

添加物として、エト酸Na、脂環族飽和炭化水素樹脂、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、BHT、ポリソフチレン、流動パラフィン、その他2成分を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきちんと閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

第2類医薬品

インドメタシン 3.5%配合

毎日のつらい痛み

サロンパス®EX



4 987188 100424

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客相談窓口」までお願い申し上げます。
製造販売元 久光製薬株式会社 〒841-0017 福岡市田代大町408番地
<http://www.hisamitsu.co.jp>
お客相談窓口 ☎0120-133250 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigi/index.html>
☎0120-149-931



7BA29T